

Snart sidste chance for at bekæmpe kamille i vinterrapsen!

Udviklingen i rapsen går stærkt, så sprøjtefristen for Matrigon/Cliophar vil indenfor kort tid udløbe. Midlerne må ikke anvendes senere end vækststadie 55. Her er blomsteranlæg på hovedskud synlige, lukkede og uden synlige kronblade (se fotos). Jo tidligere der bliver anvendt Matrigon/Cliophar i forhold til sprøjtefristen, jo mindre er risiko for clopyralid findes i honningen.

Vær klar til at udnytte den førstkomne dag med bedst mulige dag- og natte temperaturer i dagene før og efter sprøjtningen.

Anvend 200 l/ha vand og sprøjt først på dagen, så midlet optages under stigende temperaturer.



Billede 1. Rapsen er her i stadie 52, og det er ved at være sidste chance for at anvende Matrigon / Cliophar.



Billede 2. Det er for sent at sprøjte, når de første blomsterknopper er synligt gule.



Bekæmpelse af kamiller med Matrignon /Cliophar 600 SL

Som tommelfingerregel vil bekæmpelse af kamiller i en normalt udviklet afgrøde være aktuel ved mere end 0,5-1 kamilleplante pr. m². Måltrettet bekæmpelse af kamiller kan foretages med Matrignon / Cliophar 600 **senest i st. 55**.

Temperaturen er afgørende for en god virkning af Matrignon/Cliophar.

Dosis: 0,11 kg/ha Matrignon + 0,5 l/ha Renol eller
0,13 l/ha Cliophar 600 SL + 0,5 l/ha Renol.

Sprøjt kun hvis temperaturerne er gode om natten og gerne 12-15 °C om dagen i dagene før og efter sprøjtning på små kamilleplanter.