

Svampebekæmpelse i vinterbyg

Nu er de fleste marker ved begyndende skridning og det afgørende tidspunkt for en effektiv svampebekæmpelse, herunder det bedste tidspunkt til forebyggelse af angreb af ramularia, er nu. Uanset sort er der altid god betaling for en svampebekæmpelse ved begyndende skridning. Er vinterbyggen i god kondition (*ikke stresset*), kan en svampebekæmpelse ved begyndende skridning kombineres med en behandling mod aksnedknækning med ca. 0,2 l/ha Cerone. Svampesygdommen ramularia kan oftest først ses efter gennemskridning, men når først sygdommen er synlig på bladene, er det for sent at gøre noget, da etablerede angreb ikke kan bekæmpes. Risikoen for angreb øges ved perioder med bladfugt og hvis planterne er stressede. De i år store temperaturudsving mellem dag og nat sammenholdt med i flere marker en dårlig næringsstand på samme tidspunkt, har givet stressede vinterbygmarker. I 2017 oplevede vi lignende vejrtilstande med stressede planter til følge og de marker, som var dårligt beskyttede, visnede ned før tiden, hvilket typisk kostede 5 hkg/ha, men i yderste konsekvens er der set udbyttetab på over 20 hkg/ha netto ved tidlige angreb! Ved et højt smittetryk af bygrust kan der i nogle tilfælde være behov for en sen supplerende bekæmpelse efter gennemskridning.

Tablet 1. Anbefalede løsninger mod svampe og som forebyggelse af ramularia i vinterbyg.

Strategi	Middel	Dosis pr. ha	Bemærkninger
Vinterbyg:			
St. 39-55 Jo tidligere i dette interval jo bedre ift. forebyggelse af ramularia.	Propulse + Comet Pro	0,45 + 0,2 ltr.	Timing og anvendelse af SDHI-midler er meget afgørende for forebyggelse af ramularia. Behandlingen foretages optimalt ved begyndende skridning.
St. 59-69	Orius Max 200 EW	0,25 ltr.	Efter behov som opfølgning på akset mod bygrust.



Billede 1. Bygrust på de nederste blade.



Billede 2. Udbredte angreb af ramularia, som i 2017.