

**SPIREN**

9 april 2019

**HEDEGAARD**

## Ukrudtsbekæmpelse i vårkorn

Ukrudtsbekæmpelsen bør senest foretages, når det største ukrudt højest har 3-4 løvblade. Dosis hæves, hvis ukrudtet bliver stort inden bekæmpelse, ved højt ukrudtstryk eller konstateret resistent ukrudt. Se tabel nederst på siden for valg af midler mod vanskelige ukrudtsarter. På lavbundsarealer kan der ofte være behov for 2 behandlinger med et par ugers mellemrum. Husk at SU-midler som Express, Ally, Hussar m.v. og deres parallelprodukter kun må anvendes én gang pr. vækstsæson og ikke må "egen-blandes".

### Havre:

Hussar OD, Hussar Plus OD, DFF/Legacy, Pixxaro og Zypar må ikke anvendes i havre. Det betyder, at der ikke er mulighed for at bekæmpe græsser eller flyvehavre i havre. Ally 20 SX/Nicanor SG er godkendt, men kan give en gulfarvning af havre. Hvor der er stedmoder, er Ally 20 SX/Nicanor SG dog eneste mulighed for tilstrækkelig effekt.

| Ukrudtsarter   | Middel   | Dosis pr. ha                         | Bemærkning   |
|--|--|--------------------------------------|--|
| St. 20-27<br>Burresterre,<br>fuglegræs, kamille,<br>korsblomstret ukrudt,<br>pileurter m.fl.                     | Express 50 SX/Trimmer SG<br>+ Primus XL<br>+ Spredeklæbemiddel | 7 g<br>+ 0,3-0,5 ltr.<br>+ 0,15 ltr. | Højeste dosis af Primus XL ved begyndende resistente fuglegræs.  |
| St. 21-32<br>Ovenstående +<br>storkenæb, tidsler<br>resistent kamille,<br>kornblomst, gul<br>okseøje og gråbynke | Mustang Forte<br>+ Ally 20 SX//Nicanor SG                      | 0,5-0,75 ltr.<br>+ 6-10 g            | Anvendes senest st. 32. Kør tidligt mod gul okseøje, stedmoder og ærenpris og brug højeste dosering af Ally/Nicanor. Mod rodukudt køres til den sene side. Læs etikette om forbehold for efterfølgende afgrøder og halmanvendelse. |
| St. 30-39<br>Agerpadderok,<br>tidsler, gråbynke.   | MCPA<br>+ Ammoniumsulfat<br>+ Spredeklæbemiddel                | 1,0 ltr.<br>+ 2 ltr.<br>+ 0,2 ltr.   | Kræver varmt vejr og ved min. 200 ltr./ha vand.  |

| Vanskelige ukrudtsarter  | Basismidler  |
|--|--|
| Enårig rapgræs, (alm. rajgræs) (Ikke i havre)  | DFF/Legacy inden fremspiring eller Hussar Plus OD på ukrudtets kimbladstadiet i vårbyg og vårhvede |
| Storkenæb, lægejordrøg, hundepersille (Ikke i havre)                                 | Pixxaro eller Zypar  |
| Gul okseøje  | Mustang Forte* og Ally 20 SX/Nicanor SG (+ MCPA)   |
| Agerrævehale, ital. rajgræs i vårhvede   | Kun i vårhvede. Broadway + PG26N   |
| Spildkartofler (Pixxaro ikke i havre)  | Pixxaro + Starane 333 HL eller Mustang Forte   |
| Flyvehavre i vårbyg og vårhvede  | Ikke i havre. Primera Super + spredeklæbemiddel  |
| Rodukudt som tidsler, gråbynke, skræppe og agerpadderok, når skuddene er godt fremme | Mustang Forte* eller MCPA + ammoniumsulfat + spredeklæbemiddel                                     |
| Hanespore (vær især obs. i majssædskifter)   | Ikke i havre. Primera Super + spredeklæbemiddel  |

\*Mustang Forte har restriktioner for efterfølgende afgrøder.

**SPIREN**  
9 april 2019

**HEDEGAARD**

## Vårbyg og vårhvede med og uden udlæg af rajgræs til frø og efterafgrøder:

| Ukrudtsarter  | Middel  | Dosis pr. ha                        | Bemærkning  |
|---|---|-------------------------------------|---|
| St. 00 hhv. st. 12-14<br>Enårig rapgræs, alm.<br>tokimbladet ukrudt.  | <u>Lige efter såning:</u><br>DFF/Legacy   | 150 ml.                             | Splitsprøjtning anbefales ved udlæg af rajgræs og rødsvingel til frø, ved meget enårig rapgræs. DFF/Legacy udbringes umiddelbart efter såning, og der følges op mod nyfremspiret ukrudt. 0,3 l/ha Primus XL kan tilsættes i stedet for Starane 333. Se nedenstående løsninger for andre mulige valg til opfølgning i st. 12-14. |
|   | <u>Opfølgning st. 12-14:</u><br>Express 50 SX/<br>Trimmer SG<br>+ Starane 333 HL<br>+ Spredeklæbemiddel | 7 g<br>+ 0,15 ltr.<br>+ 0,15 ltr.   |   |
| St. 10-12<br>Enårig rapgræs, rajgræs,<br>vindaks, tokimbladet ukrudt.<br><b>Må ikke anvendes ved udlæg af græs til frø, foder og efterafgrøder.</b> | Hussar Plus OD*<br>+ DFF/Legacy<br>+ Renol  | 40-70 ml.<br>+ 50 ml.<br>+ 0,5 ltr. | Især aktuell ved reduceret jordbehandling, ved frøgræs i sædskiftet og/eller hvis der ikke er anvendt DFF/Legacy inden fremspiring. Der tilsættes Pixxaro efter behov. Græsukrudt skal bekæmpes. DFF/Legacy må kun tilsættes, hvis det ikke er anvendt lige efter såning.   |
| St. 12-14<br>Storke-/hejrenæb,<br>lægejordrøg, valmue,<br>hundepersille, resistent<br>fuglegræs, valmue, alm.<br>tokimbladet ukrudt.                | Express 50 SX/<br>Trimmer SG<br>+ Pixxaro<br>+ Spredeklæbemiddel  | 7 g<br>+ 0,25 ltr.<br>+ 0,15 ltr.   | Hæv Pixxaro-dosis 0,3 l/ha hvis erkendt resistent fuglegræs og sprøjt på småt ukrudt.   |
| St. 21-25<br>Kornblomster, gul okseøje,<br>resistent kamille, alm.<br>tokimbladet ukrudt.   | Mustang Forte<br>+ Ally 20 SX//Nicanor<br>SG  | 0,5 ltr.<br>+ 6-10 g                | Anvendes senest st. 32 og kan anvendes med op til 0,75 ltr./ha i st. 21-32. Kør tidligt mod gul okseøje. Mod rodukudt køres til den sene side for at sikre, at alle rodskud er fremspiret.  |
| St. 30-32<br>Ovenstående +<br>spildkartofler,<br>gråbynker, agertidsler.  | Mustang Forte<br>+ Ally 20 SX//Nicanor<br>SG  | 0,75 ltr.<br>+ 10 g                 | Læs etikette om forbehold for efterfølgende afgrøder og halmanvendelse.   |
| St. 14-25<br>Flyvehavre, vindaks.<br>Anvendes senest i st. 30.<br><b>Pas på ved udlæg af rajgræs til frø, foder og efterafg. søg rådgivning.</b>    | Primera Super<br>+ Spredeklæbemiddel  | 0,8 ltr.<br>+ 0,15 ltr.             | Der skal gå minimum en uge mellem ukrudtsbehandling og en flyvehavrebekæmpelse. Alternativt kan der foretages en samlet ukrudts- og flyvehavrebekæmpelse med 7 g Express 50 SX/Trimmer SG + 0,8 ltr. Primera Super + 0,15 ltr. Spredeklæbemiddel pr. ha.  |
| St. 30-39<br>Agerpadderok, tidsler,<br>gråbynke.  | MCPA<br>+ Ammoniumsulfat<br>+ Spredeklæbemiddel   | 1,0 ltr.<br>+ 2 ltr.<br>+ 0,2 ltr.  | Kræver varmt vejr og min. 200 ltr./ha vand.   |

\* Hvis Hussar Plus OD blandes med mangan eller Starane/Pixxaro tilsættes spredeklæbemiddel. Bruges Hussar alene eller i blanding med DFF/Legacy tilsættes s 0,5 l/ha Renol.