

Svampebekæmpelse i vårsæd

Svampebekæmpelse giver udover bedre kernekvalitet og højere udbytte også stærkere og sundere strå (forebygger aks- og strånedknækning).

Vårbyg

Vi anbefaler 2 svampebehandlinger i vårbyg. T1 i (begyndende strækning) efterfulgt af T2 (ved begyndende skridning). Kun sorten Evergreen kan klare sig igennem med en enkelt sprøjtning i T2.

Ønsker man at vækstregulere i T1 foretrækkes blandinger med Trimaxx og Moddus M på dette tidspunkt. Og i T2 vil Cerone være det bedste middel mod aksnedknækning. Husk at vækstregulering kun må udføres på afgrøder i god vækst/god vandforsyning.

Vårhvede

Afgrøden angribes i princippet af de samme svampe som vinterhvede. Dog ses angreb af gulrust og brunrust hyppigere, mens angreb af hvedebladplet (DTR) og septoria ofte er svagere i vårhvede end i vinterhvede.

Alle sorter kan få gulrust og sygdommen bør bekæmpes straks ved konstateret forekomst. Brunrust bør ligeledes bekæmpes så snart det konstateres.

Havre

Havre bliver ofte blive angrebet af meldug, og hvis angrebet er kraftigt, er der god økonomi i bekæmpelse. I nogle år kan også havrebladplet og i enkeltår også kronrust være udbredt.

Anbefalede svampestrategier i vårkorn

I tabel 1 ses vores anbefalede svampestrategier i vårbyg, vårhvede og havre.

Strategi	Middel	Dosis pr. ha	Bemærkninger
Vårbyg:			
T1 (st. 32)	Prosaro + evt 0,25 L Trimaxx alt. Moddus M mod lejesæd under gode vækstforhold.	0,25 ltr. + Evt. 0,25 ltr.	Iværksættes ved angreb bygrust og skoldplet i den tidlige strækingsfase. Vær især obs. på skoldplet på vandede lokaliteter eller ved pløjefri dyrkning med byg eller rug som forfrugt.
T2 (st. 39- 49)	Propulse + Comet Pro	0,4 + 0,2 ltr.	Denne behandling vil uanset år og sort være nødvendig hvis ønske om forebyggelse af ramularia. Løsningen sikrer også fuld effekt på bygrust og bygbladplet. I stedet for Propulse + Comet Pro kan anvendes 0,45 l/ha Bell + 0,2 l/ha Comet
Vårhvede:			
T1 (St. 31- 33)	Prosaro + Comet Pro	0,25 + 0,2 ltr.	
T2 (st. 37- 39)	Viverda + Ultimate Eller Bell + Comet Pro	0,35 + 0,5 ltr. 0,4 + 0,2 ltr.	Behandling på fanebladet bør foretages uanset hvad, og har en god bred virkning mod gulrust, septoria og brunrust. Hvis samtidig meget hvedebladplet kan i stedet anvendes 0,4 l/ha Propulse + 0,25 l/ha Orius Max 200 EW.
Havre:			
St. 33- 39	Prosaro + Comet Pro	0,25 ltr. + 0,15 ltr.	Tilsæt evt 0,25 ltr. Trimaxx eller Moddus M mod lejesæd under gode vækstforhold. Tjek ved samme lejlighed marken for kornbladbillens larve.